Eagle* WSP

Fongicide pour gazon et plantes ornementales

GROUPE	3	FONGICIDE

en sachets hydrosolubles

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Myclobutanil 40%

N^{O} D'HOMOLOGATION 26585 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION **POISON**

AVERTISSEMENT: IRRITANT POUR LES YEUX

NE PAS VENDRE LES SACHETS HYDROSOLUBLES INDIVIDUELLEMENT

CONTENU NET: 0,340 KG (4 X 85 g sachets hydrosolubles)

Dow AgroSciences Canada Inc.
Suite 2100, 450 - 1 Street S.W.
Calgary, Alberta
T2P 5H1
1-800-667-3852

*Marque de commerce de Dow AgroSciences LLC

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS APPLIQUER PAS VOIE AÉRIENNE
Dangereux pour les humains et les animaux domestiques. Cause une irritation des yeux. L'ingestion, l'inhalation et l'absorption cutanée ont des effets nocifs. NE PAS ingérer, éviter tout contact avec les yeux ou la peau, et éviter de respirer le brouillard de pulvérisation.

VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Porter des lunettes de sécurité, des gants résistant aux produits chimiques, un casque de protection résistant aux produits chimiques, une chemise à manches longues et un pantalon pour effectuer le mélange, le chargement et l'application du produit. Enlever l'équipement de protection immédiatement après avoir manipulé le produit. Laver l'extérieur des gants avant de les enlever. Aussitôt que possible, se laver à fond et remettre des vêtements propres. Jeter les vêtements et autres articles faits d'un matériau absorbant qui sont imbibés du produit concentré ou qui ont été très contaminés par celui-ci. Ne pas les réutiliser. Laver séparément les vêtements contaminés à l'eau chaude et au détergent avant de les remettre. Bien se laver après la manutention du produit et avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Ne pas pénétrer dans les zones traitées tant que le produit pulvérisé n'est pas sec. Pendant l'application, veiller à ce que personne ne soit exposé directement ou indirectement au brouillard de pulvérisation. Seuls les opérateurs protégés peuvent se trouver dans la zone pendant l'application.

PREMIERS SOINS
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.
En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Aucun antidote spécifique. Donner des soins de soutien. Le médecin doit décider du traitement à instaurer en fonction des réactions du patient.

PRODUIT CHIMIQUE AGRICOLE
Ne pas entreposer ni expédier près des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques ou des vêtements.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT
Ne pas appliquer directement dans l'eau, dans les endroits où il y a des eaux de surface, ou dans les zones intertidales situées sous la limite de marée haute moyenne. Ne pas contaminer l'eau en y

déversant les eaux de rinçage de l'équipement. Ne pas appliquer dans des conditions atmosphériques propices à la dérive ou à l'écoulement du brouillard de pulvérisation hors des zones traitées. **NE PAS APPLIQUER LE PRODUIT À MOINS DE 15 MÈTRES D'HABITATS AQUATIQUES.**

ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit frais et sec, au-dessus du point de congélation. Les sachets hydrosolubles risquent de s'effriter à moins de 0 ^{o}C. Ne retirer les sachets hydrosolubles du contenant que pour utilisation immédiate.

Ne pas entreposer ni éliminer d'une manière qui risque de contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Les déchets de pesticides sont toxiques. L'élimination des résidus de pesticides, des mélanges de pulvérisation ou des rinçures par des moyens inappropriés est interdite. S'il est impossible d'éliminer ces déchets selon les instructions figurant sur l'étiquette, contacter l'organisme de réglementation provincial ou le fabricant.

ÉLIMINATION
1. Lorsque tous les sachets hydrosolubles ont été utilisés, rendre le suremballage inutilisable.
2. Éliminer le suremballage conformément à la réglementation provinciale.
3. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

INFORMATION GÉNÉRALE
Le fongicide Eagle WSP pour gazons et plantes ornementales est un fongicide à action curative et préventive recommandé pour la suppression des maladies spécifiés sur l'étiquette. Son action est optimale lorsqu'il est appliqué de façon régulière dans un programme de pulvérisation préventive.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
- **NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE - N'APPLIQUER QU'AU SOL.**
- Ne pas faire paître le bétail dans la zone traitée. Ne pas nourrir le bétail ou la volaille avec les résidus provenant de la taille des arbustres ou du gazon traités.
- Garder à l'abri du gel.

Mélanges en réservoir
Ne pas appliquer ce produit avec tout additif, pesticide ou fertilisant autres que ceux qui sont précisément recommandés sur cette étiquette.

Taux d'utilisation
Bien lire, comprendre et suivre les taux d'utilisation et les restrictions indiqués sur l'étiquette. Pour une application adéquate, déterminer l'étendue de la zone à traiter, le taux d'utilisation recommandé sur l'étiquette, et le volume d'eau à être appliqué sur la zone. Ne préparer que la quantité de solution à pulvériser requise pour traiter la zone délimitée. Il est recommandé d'effectuer un étalonnage soigné de l'équipement de pulvérisation avant de commencer.

Manipulation
Ces sachets de fongicide Eagle WSP sont hydrosolubles. Ne pas les laisser se mouiller avant de les ajouter au réservoir du pulvérisateur. Ne pas manipuler les sachets avec des mains ou des gants mouillés. Toujours resceller le sac afin de protéger les sachets non utilisés. Ne retirer les sachets hydrosolubles du suremballage que pour les ajouter directement au réservoir du pulvérisateur.

Mélange
Toujours ajouter le fongicide Eagle WSP à la solution avant d'y mettre tout autre produit homologué pour utilisation spécifique décrite sur cette étiquette. Ajouter par agitation dans le réservoir du pulvérisateur le nombre requis de sachets non ouverts tel que déterminé par les recommandations de dosage. Selon la température de l'eau et le degré d'agitation, les sachets devraient se dissoudre complètement en cinq minutes environ à partir du moment où ils ont été ajoutés à l'eau.

Note : Les sachets hydrosolubles de fongicide Eagle WSP doivent être complètement dissous avant d'ajouter des huiles de pulvérisation ou des produits contenant du bore aux mélanges à pulvériser.

MODE D'EMPLOI
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'APPLICATION. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE PEUT ENTRAÎNER UN EFFET FONGICIDE IRRÉGULIER OU DES DOMMAGES AUX CULTURES.

Mode d'application
Équipement terrestre : L'équipement d'application doit être correctement calibré et doit fournir une pulvérisation uniforme.

Pulvérisateurs manuels ou sous pression : Appliquer sur les feuilles des plantes ornementales en volume suffisant pour bien couvrir jusqu'au ruissellement.

Herbe à gazon - Pour utilisation sur terrains de golf seulement. Ne pas appliquer sur les pelouses de zones résidentielles ou récréatives. Ne pas appliquer dans les gazonnières.

Le fongicide Eagle WSP doit être utilisé selon des pratiques de gestion du gazon qui favorisent la santé des plantes et une suppression optimale des maladies. Pour choisir le fongicide à utiliser, il est important de bien identifier quel est l'organisme qui cause la maladie. Avoir recours à des trousses de diagnostic, à des conseillers en matière de lutte antiparasitaire, ou à d'autres méthodes d'identification pour établir des stratégies de suppression des maladies.

Une suppression optimalede la maladie est atteinte lorsque le fongicide Eagle WSP est appliqué au taux décrit ci-dessous dans le cadre d'un programme préventif de suppression de la maladie.

Le fongicide Eagle WSP doit être utilisé avec suffisamment d'eau afin d'assurer une couverture complète. Pour la brûlure en plaques, utiliser environ 4 litres par 100 mètres carrés.

Pour la suppression de la brûlure en plaques, appliquer 15-20 grammes de fongicide WSP Fungicide par 100 mètres carrés. Commencer les applications avant ou aussitôt qu'apparaissent les premiers signes ou symptômes de la maladie. Une suppression optimale est atteinte lorsque le fongicide Eagle WSP est appliqué selon un calendrier préventif de 14 à 21 jours. Ne pas effectuer plus de 4 applications par année.

Si les conditions de développement de la maladie sont optimales, le délai entre chaque application doit être au minimum et à un taux de 20 grammes par 100 mètres carrés.

Ne pas appliquer par le biais d'un système d'irrigation. Laisser les zones pulvérisées sécher avant d'effectuer un arrosage ou une coupe. Pour de meilleurs résultats, appliquer les fongicides après avoir coupé le gazon.

Utiliser le fongicide Eagle WSP en rotation avec un fongicide dont le mode d'action est différent, ou mélangé en cuve avec un fongicide dont le mode d'action est différent (voir ci-dessous). Cette alternance ou ce mélange de fongicides aux modes d'action différents empêcheront ou retarderont la sélection de souches fongiques à sensibilité réduite.

Le fongicide Eagle WSP peut être mélangé en cuve avec le fongicide Daconil[1] et appliqué selon un calendrier préventif de 21 à 28 jours. Consulter l'étiquette du fongicide Daconil pour les recommandations précises et les directives d'utilisation de ce produit.

Roses et genévriers - pour utilisation extérieure seulement.
Pour assurer une meilleure suppression de la maladie, appliquer le fongicide Eagle WSP selon un calendrier préventif avec suffisamment d'eau et de pression pour bien couvrir les feuilles jusqu'au ruissellement. Il est recommandé d'appliquer le fongicide Eagle WSP à un taux de 30 grammes par 100 litres d'eau
(0,3 gramme par litre ou un sachet dans 280 litres) selon un calendrier de 10 à 14 jours à moins d'indication contraire ci-dessous. Ne pas effectuer plus de 4 applications par année. Pour des pulvérisations concentrées, ajuster les quantités en conséquence. Les plantes traitées doivent être entretenues afin d'assurer une croissance vigoureuse. Les plantes soumises à un stress nutritionnel, hydrique ou autre ne réagiront pas aussi bien au traitement que celles qui sont bien entretenues. Une surdose de fongicide Eagle WSP peut entraîner la virescence des feuilles (maladie du greening) et des entrenoeuds plus courts. Si une de ces conditions apparaît, réduire le taux d'utilisation du fongicide, mais ne pas prolonger le calendrier d'application.

Il est impossible d'évaluer la tolérance au fongicide Eagle WSP de toutes les variétés de plantes ornementales. Il incombe à l'utilisateur de tester les réactions phytotoxiques possibles en traitant un nombre limité de plantes, aux taux d'utilisation recommandés, avant d'effectuer un traitement à grande échelle.

Roses
Pour supprimer le blanc et la tache noire, appliquer le fongicide Eagle WSP selon un calendrier de 14 jours. Si les signes de maladie sont plus graves, réduire les intervalles d'application à 10 jours.

Genévriers
Pour supprimer la rouille, appliquer le fongicide Eagle WSP en août et en septembre tous les 14 jours. Pour une meilleure suppression, mélanger en cuve avec le fongicide Dithane* DG à un taux de 150 grammes par 100 litres (1,5 gramme par litre). Effectuer la pulvérisation des plantes la première année car la rouille peut infester le feuillage durant plus d'une année.

AVIS À L'UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ : Le MODE D'EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Dow AgroSciences Canada Inc. et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Dow AgroSciences Canada Inc. ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous.

En foi de quoi l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager Dow AgroSciences Canada Inc. de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits ci-dessous.

MODE D'EMPLOI

HERBE À GAZON - Pour supprimer la plaque brune, la moisissure grise des neiges, la rouille noire et la tache estivale.
Plaque brune : Appliquer le fongicide Eagle WSP à un taux de 18g/100m^2 tous les 14 jours si nécessaire. Ne pas effectuer plus de 4 applications par année.
Moisissure grise des neiges : Appliquer le fongicide Eagle WSP à un taux de 30g/100m^2. N'effectuer qu'une seule application par année.
Rouille de la tige: Appliquer le fongicide Eagle WSP à un taux de 18g/100m^2 tous les 28 jours si nécessaire. Ne pas effectuer plus de 4 applications par année.
Tache estivale : Appliquer le fongicide Eagle WSP à un taux de 18g/100m^2 tous les 30 jours. Ne permet le contrôle qu'en cas de maladie bénigne ou modérée.

Consulter l'étiquette principale de le fongicide Eagle WSP avant l'utilisation pour obtenir des détails et des instructions supplémentaires.

LIRE LES RESTRICTIONS CONCERNANT LA ROTATION DES CULTURES FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE COMPLÈTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DE LA RÉSISTANCE
Gestion de la résistance, le fongicide Eagle WSP fongicide de groupe 3. Toute population fongique peut renfermer des individus naturellement résistants à le fongicide Eagle WSP et à d'autres fongicides du groupe 3. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides:
- Dans la mesure de possible, alterner le le fongicide Eagle WSP ou les fongicides du même groupe 3 avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes pathogènes.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et sur l'assolement, et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques) ou de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.

- Inspecter les populations fongiques traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Lorsque la maladie continue de progresser après traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser d'employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d'action différent, si possible.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Dow AgroSciences Canada Inc. au 1-800-667-3852 ou à www.dowagro.ca.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

*Marque de commerce de Dow AgroSciences LLC
[1]Daconil est une marque de commerce de Syngenta Company

101508

Code de l'étiquette: CN-26585-002-F
Remplace: CN-26585-001-F